

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN 'AISYIYAH PALEMBANG
PROGRAM STUDI D III KEBIDANAN**

KARYA TULIS ILMIAH, DESEMBER 2022

Efiana Oktavia

**Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Persalinan Kala II Lama Di
Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang Tahun 2022**

xvii + 58 halaman + 6 tabel + 2 skema + 5 istilah dan 6 lampiran

ABSTRAK

Kala 2 lama merupakan persalinan yang berlangsung lebih dari 2 jam pada primigravida dan lebih dari 1 jam multigravida. Kala II lama dapat menyebabkan pendarahan yang mengakibatkan terjadinya kematian pada ibu, di Indonesia pada tahun 2020 kematian pada ibu di akibatkan pendarahan yaitu (28,29%), sedangkan di Sumatra Selatan penyebab kematian pada ibu di akibat perdarahan yaitu (31,25%).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan persalinan kala II lama di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang pada tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian survei analitik dengan pendekatan *cross sectional*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu bersalin di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang Tahun 2021, sampel diambil dengan teknik *systematic random sampling* sebanyak 189 responden. Data diolah secara analisis univariat dan bivariat dengan menggunakan *chi-square*.

Berdasarkan hasil univariat responden yang tidak mengalami kala II lama sebanyak (73,0%). Hasil bivariat menggunakan uji *chi-square* didapatkan ada hubungan antara usia (*p value* 0,016), KPD (*p value* 0,022), BBL (*p value* 0,000). Sedangkan tidak ada hubungan antara paritas dengan persalinan kala II lama (*p value* 0,188).

Saran: diharapkan kepada tenaga kesehatan untuk dapat lebih aktif dalam memotivasi ibu untuk melakukan pemeriksaan antenatal dan senam ibu hamil secara rutin sehingga risiko dan komplikasi dapat terdeteksi lebih dini.

Kata kunci : Usia, KPD, Berat Bayi Lahir dan Kala II lama
Daftar Pustaka : 18 (2010-2020)

**‘AISYIYAH HEALTH SCIENCE COLLEGE OF PALEMBANG
D III MIDWIFERY STUDY PROGRAM**

SCIENTIFIC PAPER, DECEMBER 2022

Efiana Oktavia

**Factors Associated with Old Second Stage Labor at Muhammadiyah
Palembang Hospital in 2022**

xvii + 58 pages + 6 tables + 2 schemes + 5 terms and 6 appendices

ABSTRACT

Long second stage is labor that lasts more than 2 hours in primigravidas and more than 1 hour in multigravidas. Long second stage can cause bleeding which results in maternal death, in Indonesia in 2020 maternal deaths are due to bleeding, namely (28.29%), while in South Sumatra the causes of maternal death are due to bleeding, namely (31.25%).

This study aims to determine the factors associated with prolonged second stage of labor at Palembang Muhammadiyah Hospital in 2022. This research is an analytic survey study with a cross-sectional approach. The population in this study were all mothers giving birth at Muhammadiyah Palembang Hospital in 2021, samples were taken using a systematic random sampling technique of 189 respondents. Data were processed using univariate and bivariate analysis using chi-square.

Based on the univariate results of respondents who did not experience a long second stage (73.0%). Bivariate results using the chi-square test found that there was a relationship between age (p value 0.016), KPD (p value 0.022), birth weight (p value 0.000). While there is no relationship between parity and prolonged second stage of labor (p value 0.188).

Suggestion: it is hoped that health workers can be more active in motivating mothers to carry out routine antenatal checks and exercise for pregnant women so that risks and complications can be detected earlier.

Keywords : Age, KPD, Birth Weight and Old Stage II
References : 18 (2010-2020)