

**UNIVERSITAS AISYIYAH PALEMBANG PROGRAM DIII KEBIDANAN
FAKULTAS KESEHATAN DAN TEKNOLOGI**

Karya Tulis Ilmiah, November 2025

Aisyah Rahma Utami

**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendarahan PostPartum di Rumah Sakit
Muhammadiyah**

Palembang Tahun 2025

(xvii+33 halaman, 3 bagan, 3 tabel, 8 lampiran)

ABSTRAK

Latar Belakang: Pendarahan postpartum yang tidak segera ditangani dapat menimbulkan berbagai dampak serius baik bagi ibu maupun keluarga. Dampak utamanya adalah meningkatnya risiko kematian ibu akibat kehilangan darah dalam jumlah besar yang menyebabkan syok hipovolemik. Pendarahan postpartum juga dapat menimbulkan anemia berat, kelemahan fisik, gangguan pada sistem organ, serta memperlambat proses pemulihan setelah persalinan. Faktor resiko yang mempengaruhi kejadian perdarahan postpartum adalah partus lama, anemia, paritas, peregangan uterus yang berlebihan, oksitosin drip, persalinan dengan tindakan dan lain-lain. **Tujuan:** Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian pendarahan postpartum di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara survey analitik dengan pendekatan *Case Control*. **Hasil:** Uji Chi-square menunjukkan Ada Pengaruh Antara Usia Ibu ($p=0,000$), Anemia ($p=0,002$), Paritas ($p=0,003$) dengan Kejadian Pendarahan Postpartum. **Kesimpulan:** Oleh karena $p\text{-value}$ $0,001 < \alpha(0,005)$, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara paritas, usia ibu, dan anemia dengan kejadian pendarahan postpartum di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang Tahun 2025.

Kata Kunci: Kejadian Pendarahan Postpartum, Usia Ibu, Anemia, Paritas

Kepustakaan: 2019-2024

**AISYIYAH UNIVERSITY OF PALEMBANG D3 MIDWIFERY PROGRAM
 FACULTY OF HEALTH ANF TECHNOLOGY**

Scientific Paper, November 2025

Aisyah Rahma Utami

Factors Influencing Postpartum Hemorrhage at Muhammadiyah Hospital, Palembang, 2025

(xvii+33 pages, 3 charts, 3 tables, 8 appendices)

ABSTRACT

Background: Postpartum hemorrhage that is not immediately treated can cause various serious impacts for both the mother and the family. The main impact is an increased risk of maternal death due to large amounts of blood loss that causes hypovolemic shock. Postpartum hemorrhage can also cause severe anemia, physical weakness, disorders of the organ system, and slow the recovery process after delivery. Risk factors that influence the incidence of postpartum hemorrhage are prolonged labor, anemia, parity, excessive uterine stretching, oxytocin drip, operative delivery and others. **Objective:** To determine the factors that influence the incidence of postpartum hemorrhage at Muhammadiyah Hospital Palembang. **Method:** The research method used in this study is an analytical survey with a Case Control approach. **Results:** The Chi-square test shows that there is an influence between maternal age ($p = 0.000$), anemia ($p = 0.002$), parity ($p = 0.003$) and the incidence of postpartum hemorrhage. **Conclusion:** Because the p-value is $0.001 < \alpha(0.005)$, it can be concluded that there is a relationship between parity, maternal age, and anemia with the incidence of postpartum hemorrhage at Muhammadiyah Hospital Palembang in 2025.

Keywords: Postpartum Hemorrhage, Maternal Age, Anemia, Parity

Bibliography: 2019-2024